



nazwa: **DermaPharm Stress Out Shot dla psa i kota**
blister 10 tabl.

marka: **DermaPharm**

cena: **30.00 zł**

STRESS OUT SHOT TABLETS to preparat zawierający naturalne składniki: alfa-kazozepinę, L-tryptofan oraz witaminy z grupy B. Przeznaczony do stosowania w sytuacjach nagłych, wywołujących stres (m.in. gwałtowne zmiany, wizyta u lekarza weterynarii, w salonie groomerskim, fajerwerki, burza, podróż, hospitalizacja, procedury medyczne np. kroplówki). Zalecenia: 1 tabletki/10 kg masy ciała na dobę, jednorazowo, między posiłkami. Oczekiwany efekt można uzyskać już pierwszego dnia stosowania. W indywidualnych przypadkach może wystąpić konieczność rozpoczęcia podawania 2-5 dni wcześniej. Podawać do 3 tyg., dłuższy czas stosowania skonsultować z lekarzem weterynarii. Dla psów i kotów powyżej 3 m-ca życia. Nie powoduje uzależnień. Składniki aktywne: α-KAZOZEPINA (Lactium®) jest naturalnym peptydem otrzymywanym z mleka krowiego, pomagającym ssakom osiągnąć stan relaksacji (mechanizm jej działania został rozpoznany u noworodków karmionych mlekiem matki) □ L-TRYPTOFAN zmniejsza napięcie mięśniowe i podatność na stres jest aminokwasem egzogennym - musi być dostarczany organizmowi z dietą jest prekursorem serotoniny (neuroprzekaźnika regulującego nastrój), niezbędnym do jej syntezy □ WITAMINY Z GRUPY B są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu nerwowego Skład: suszone drożdże piwne, kazeina bydlęca hydrolizowana trypsyną (Lactium® -źródło α-kazozepiny) 11,5%, fosforan jednowapniowy, hydrolizowana wątroba drobiowa, hydrolizowana wątroba wieprzowa, stearynian magnezu. Dodatki: technologiczne: 1/E466/ karboksymetyloceluloza, 1/E460/ celuloza mikrokryształiczna, 1/E551b/ krzemionka koloidalna; dietetyczne: 3c440/ L-tryptofan (210 g/kg), 3a831/ witamina B6 (300 mg/kg), 3a835/ witamina B12 (3 mg/kg). Składniki analityczne: białko surowe: 55,1%, tłuszcz surowy: 1,6%, włókno surowe: 2,5%, popiół surowy: 11,5%, magnez: 0,3%, fosfor całkowity 1,8%, wapń 0,9%. Dawkowanie: 1 tabletki/10 kg masy ciała na dobę, jednorazowo, między posiłkami. Oczekiwany efekt można uzyskać już pierwszego dnia stosowania. W indywidualnych przypadkach może wystąpić konieczność rozpoczęcia podawania 2-5 dni wcześniej. Podawać do 3 tyg., dłuższy czas stosowania skonsultować z lekarzem weterynarii. Dla psów i kotów powyżej 3 m-ca życia. Nie powoduje uzależnień. □